





## NEOSEALER (DUTCH)

SAMENSTELLING EN BESCHRIJVING Bioactieve pasta bestaande uit een ontzettend fijn, anorganisch poeder van tricalciumdicalciumsilicaat in een organisch medium. Het product is gebruiksklaar gepakt. Mengin is niet nodig. NEOSEALER Flo is ontworpen om in vivo te harden in aanwezigheid van vocht van de omringende weefsels. MATERIALEIGENSCHAPPEN • Bioactieve organische keramiek • Verkleurt de tanden niet • Radiopaak • Zonder hars • INDIKATIES Obturatie en afslchting van wortelkanalen. CONTRA-INDICATIES • Overgevoeligheid voor bijtende oplossingen (met hoge pH-waarde). • Niet gebruiken voor pulpectomie van de primaire tand (wortelkanaalvulling) tenzij de permanente opvolger land ontbreekt. ONGEWENSTE BIJWERKINGEN Ontkermende actie onteking van het mondslijmvlies bij contact met ongeharte pasta. WAARSCHUWINGEN NEOSEALER Flo is bijland, net als alle andere tricalciumsilicaaten. INTERACTIES MET ANDERE TANDHEELKUNDIGE MATERIALEN Ontkend. • Bioactieve beting • Bewaar op kamertemperatuur, (BEWAAR NIET IN DE KOELKAST). Na elk gebruik het product goed sluiten, om verharding te voorkomen. Bewaar de injectiespil in de bijgevoegde aluminium beschermverpakking.

## FRANÇAISE (FRENCH)

COMPOSITION & DESCRIPTION Pâte bioactive constituée d'une poudre inorganique extrêmement fine de silicate tricalco-dicalcico en milieu organique. Le produit est prêt à l'emploi. Aucun mélange n'est nécessaire. NEOSEALER Flo est conçu pour se fixer in vivo en présence de l'humidité fournie par les tissus environnants. CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIEAUX • Bioactives organiques • Ne décolore pas les dents • Radiopaque • Sans résine RECOMMANDATIONS Obtenir un scellement des canaux radicaires. CONTRA-INDICATIONS • hypersensibilité aux solutions caustiques (pH élevé). • Ne pas utiliser pour la pulpectomie de la dent primaire (obturation du canal radiculaire), sauf si la dent successeur permanente est absente. EFFETS INDÉSIRABLES Inflammation aiguë réversible de la muqueuse buccale en cas de contact avec la pâte non durcie. AVERTISSEMENTS NEOSEALER Flo est caustique, comme tous les silicates tricalciques. INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MATÉRIEAUX DENTAIRES Aucune connue. STOCKAGE A conserver à température ambiante. (NE PAS RÉFRIGÉRER). Pour éviter le durcissement du NEOSEALER Flo, fermez immédiatement après chaque utilisation. Conservez la seringue dans le récipient protecteur en aluminium fourni.

## DEUTSCH (GERMAN)

ZUSAMMENSETZUNG & BESCHREIBUNG Bioaktive Pasta, bestehend aus einem extrem feinen, anorganischen Pulver von Trikalzium-Dikalziumsilikat in einem organischen Medium. Das Produkt ist gebrauchsfertig verpackt. Es ist keine Vermischung erforderlich. NEOSEALER Flo wird empfohlen, um in vivo in Gegenwart von Feuchtigkeit aus dem umgebenden Gewebe auszuhärten. MATERIALEIGENSCHAFTEN • Bioaktive Biokeramik • Verfärbt die Zähne nicht • Röntgenicht • Frei von Harzen INDIKATIONEN Obturation und Versiegelung von Wurzelkanälen. KONTRAINDIKATIONEN • Überempfindlichkeit gegen ätzende (hohe pH-) Lösungen. • Nicht für die primäre Zahnpulpektomie (Wurzelkanalfüllung) verwenden, es sei denn, der permanente Nachfolgebahn fehlt. NEBENWIRKUNGEN Reversible, akute Entzündung der Mundschleimhaut, wenn diese mit der nicht gesetzten Paste in Kontakt kommt. WARNUNGEN NEOSEALER Flo ist, wie alle Trikalziumsilikate, ätzend. WEGWEISMATERIALIEN MIT ANDEREN ZAHNMATERIALIEN Unbekannt. LAGERUNG Bei Raumtemperatur aufbewahren, (NICHT KÜHLEN). Um eine Aushärtung von NeoSEALER Flo zu verhindern, verschließen Sie es sofort nach jedem Gebrauch. Bewahren Sie die Spritze im mitgelieferten Aluminiumschutzbehälter auf.

## ITALIANO (ITALIAN)

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE Pasta bioattiva costituita da una polvere inorganica estremamente fine di silicato tricalcico e dicalcico in un substrato organico. Il prodotto è confezionato pronto all'uso. Non è necessaria alcuna miscelazione. NEOSEALER Flo è progettato per fissarsi in vivo in presenza di umidità fornita dai tessuti circostanti. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE • Bioceramica bioattiva • Non scolorisce i denti • Radiopaco • Senza resina INDIKAZIONI Obstruzione e chiusura dei canali radicolari. CONTRAINDICAZIONI •ipersensibilità contro le soluzioni caustiche (a pH elevato). • Non utilizzare per la pulpectomia del dente primario (obturazione del canale radicolare) a meno che non sia assente il dente succettore permanente. REAZIONI AVVERSE Infiammazione acuta reversibile della mucosa orale se viene a contatto con la pasta non ancora indurita. AVVERTENZE NEOSEALER Flo è caustico, come tutti i silicati tricalcici. INTERAZIONI CON ALTRI MATERIALI DENTALI Nessuna nota. CONSERVAZIONE Conservare a temperatura ambiente. (NON CONSERVARE IN FRIGORIFERO). Per evitare l'indurimento del NeoSEALER Flo, riposizionare immediatamente il tappo dopo ogni utilizzo. Conservare la siringa nel contenitore di alluminio protettivo fornito in dotazione.

## ESPAÑOL (SPANISH)

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN Pasta bioactiva compuesta por un polvo inorgánico extremadamente fino de silicato tricalcico/dicalcico en un medio orgánico. El producto está embalo-listo para usar. No se requiere mezcla. NEOSEALER Flo está diseñado para instalarse in vivo, en presencia de la humedad suministrada por los tejidos adyacentes. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL • Biocerámico bioactivo • No decolora los dientes. • Radiopaco • Sin resina INDICACIÓN Obturación y sellado de endodencias. CONTRAINDICACIONES • Hipersensibilidad a soluciones causticas (pH alto) • No usar para la pulpectomia dental primaria (llenado del conducto radicular) a menos que el dente sucesor permanente esté ausente. REACCIONES ADVERSAS Infiamación aguda reversible de la mucosa oral que entra en contacto con pasta que no está seca. ADVERTENCIAS NEOSEALER Flo es cáustico, al igual que todos los silicatos tricalcicos. INTERACCIONES CON OTROS MATERIALES DENTALES Ninguna conocida. ALMACENAMIENTO Almacenar a temperatura ambiente. (NON REFRIGERARE). Para evitar el endurecimiento del NEOSEALER Flo, tape inmediatamente después de

## PORTUGUÊS (PORTUGUESE)

COMPOSIÇÃO E DESCRIÇÃO Pasta bioativa composta por um póv inorgânico extremamente fino de silicato tricalcico/dicalcico em um meio orgânico. O produto é embalado, pronto para uso. Não precisa misturar. NEOSEALER Flo é desenvolvido para endurecer in vivo na presença de umidade fornecida pelos tecidos circundantes. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL • Biocerâmica bioativa • Não descolore os dentes • Radiopaca • Sem resina INDICAÇÃO Obstrução e selamento de canais radiculares. CONTRAINDICAÇÕES • Hipersensibilidade a soluções cáusticas (alto pH) • Não usar para a pulpectomia dental primária (lenado do conduto radicular) a menos que o dente sucessor permanente esteja ausente. REAÇÕES ADVERSAS Infamação aguda reversível da mucosa oral quando em contato com a pasta não endurecida. ADVERTÊNCIAS O NeoSEALER Flo é cáustico, assim como todos os silicatos tricalcicos. INTERAÇÕES COM OUTROS MATERIAIS DENTÁRIOS Não se conhecem. ARMAZENAMENTO Armazenar em temperatura ambiente. (NÃO REFRIGERAR). Para evitar o endurecimento do NeoSEALER Flo, tape imediatamente após cada uso.

uso. Armazene a seringa no recipiente protor de alumínio fornecido.

PRECAUÇÕES • Não encher demais os condutos radiculares. Quando uma grande quantidade de material está sobrecargada em o conduto mandibular (conduto alveolar inferior), se debe considerar la extracción inmediata del material. Este procedimiento debe usarse en todos los materiales de conduto radicular, de acuerdo con la política más avanzada.

• Minimice la sobre-extensión del material más allá del ápice.

• Evite el contacto del sellador sin fugar con la piel o la mucosa oral. Después de la preparación de cada uso, enjuagar con agua.

• Usar guantes adecuados y gafas protectoras durante el uso.

• NEOSEALER Flo DEBE MANTENERSE BIEN CERRADO. Vuelva a taparlo inmediatamente después de cada uso.

• Para proteger contra la intrusión de humedad, guarde NeoSEALER Flo en su contenedor protector de aluminio.

• Utilice siempre un nuevo Tipal aplicar NeoSEALER Flo.

• Evite el contacto de la seringa con superficies contaminada.

• Cubrir el cuerpo de la jeringa con una funda protectora desechable si se usa por vía intraoral, para minimizar la contaminación de la jeringa.

• NeoSEALER Flo y las Tps se proporcionan en envases limpios y no esterilizados. Estos productos no pueden ser esterilizados. Los médicos deben seguir sus protocolos establecidos para la limpieza de la seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.

• Usar sempre uma nova Tipao aplicar o NeoSEALER Flo.

• Evite tocar a seringa em uma superfície contaminada.

• Cobrir o corpo da seringa com uma luva protetora descartável, se usada intraoralmente para minimizar a contaminação da seringa.

• Inserir NeoSEALER Flo em uma embalagem limpa e não esteril. Este produto não pode ser esterilizado. Os clínicos devem seguir os protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção da seringa NeoSEALER Flo entre os usos.